



樹林地區常見留鳥

文・攝影／周大慶

本期要介紹的鳥類在樹林常見，鵲鵌、黑枕藍鵲和樹鵲是普遍的留鳥，樹鵲還是特有亞種，喜鵲在臺大校園常見，可是吉利鳥。

鵲鵌 Oriental Magpie Robin

學名：*Copsychus saularis*

鵲鵌在金門為普遍的留鳥，在臺灣目前認為係籠中逸鳥。其主要族群分布於熱帶亞洲，由孟加拉、巴基斯坦至中國和菲律賓，在中國原分布於華中、華南、西南和東南沿海一帶之低海拔已開發果林、疏林和人類居所附近。

全身長約20cm。雄鳥體色黑白相間，下胸腹、尾下覆羽、尾羽外側及飛羽與覆羽間為白色，其他部位則為黑色至寶藍色。雌鳥似雄鳥，惟其體色較近於灰褐色。

築巢於洞中，由雌雄鳥輪流孵蛋。有固定的棲息地，常停於樹梢上鳴叫，叫聲婉轉優美，四季皆可鳴唱，成為被捕捉販售主因。以昆蟲為主食。近年在臺大校園數量漸多，不甚畏人，易於觀察或拍攝。

黑枕藍鵲 Black-naped Blue Monarch

學名：*Hypothymis azurea*

黑枕藍鵲廣布東亞和東南亞，又名黑枕王鵲、染布鳥、黑頸鵲。棲息於平原和低海拔濃密的森林。於臺灣為普遍的留鳥。

全身長約15cm。雄鳥全身為有光澤的寶藍色，後頭



■ 鵲鵌常停於樹梢上鳴叫，因叫聲婉轉優美而成為被捕捉販售的主因。

頂有黑斑，因而得名。雌鳥則較暗淡，頭部灰藍，無黑枕，體背為灰褐色，腹面污白色。

單獨或成對活動，繁殖季結束偕幼鳥行動。築巢於藤蔓或樹枝分叉處，由雌雄共同擔任育雛工作。常發出「回、回、回、回」宏亮之鳴聲。繁殖季為4~7月，每巢約3顆蛋，孵蛋期為14天，10日齡雛鳥羽毛未豐已可離巢，約2個月齡開始獨立生活。喜於密林藤蔓糾葛之林內活動，常與繡眼畫眉、粉紅鸚嘴、綠繡眼等鳥群一起活動覓食，這種現象稱為「混群」。成群活動的鳥有機會驚動更多的小蟲，增加捕食機會。領



■ 黑枕藍鵲一身寶藍色，被冠以「染布鳥」之名。

■ 喜鵲在臺大校園常見，圖為喜鵲現身農場。（攝影／丁詩同）

域性強，終年占有領域。以昆蟲及小型無脊椎動物為主食。

舊時染布的藍色染料為「靛藍」，傳說黑枕藍鶇便好似舊時染布工，因辛勤工作，而將全身上下全染成了藍色，因而有染布鳥之俗稱。

樹鵲 Himalayan Tree Pie

學名：*Dendrocitta formosae*

樹鵲又名灰樹鵲，臺語俗稱「咖咖仔」，為臺灣特有亞種，廣泛分布於臺灣平原至中低海拔山區的樹林地帶。

全身長約34cm。額、腮、兩翼及尾羽為黑色，翼上有白色翼斑。頭頂至後頸鼠灰色。背部及胸栗褐色。腹部污白色，嘴型粗厚，略為下彎。

為臺灣普遍的留鳥。常成小群於樹林上層活動，亦會至地面覓食，跳躍前進。警覺性高，常發出「嘎兒—葛哩哦」或「嘎、嘎、嘎—」的警戒聲。飛行時呈波浪形，翼上白斑清晰易見。每年4~6月為繁殖季，築巢於樹上，巢以細樹枝堆疊，每窩約產2~4顆蛋。以昆蟲、植物果實為主食。

智商高，和藍鵲常被捕捉馴養，但成熟後經常逃逸。過去校園中有人士於固定地點棄置便當，吸引許多鳥類前來覓食，包括麻雀、紅嘴黑鵯、白頭翁、樹鵲等，樹鵲仗著體型大，總能搶先進食，其動作細



■ 臺灣特有亞種「樹鵲」，智商高，和臺灣藍鵲一樣常被捕捉，可也很會「落跑」。



膩，會先扯開橡皮筋，再翻開便當蓋，令人印象深刻。

喜鵲 Black-billed Magpie

學名：*Pica pica*

喜鵲又稱「客鳥」，相傳是客家裔由中國引入臺灣而得名。全身長約45cm。頭頸、背、胸黑色，肩羽及腹為白色，尾甚長，為藍綠色。

分布平地、山丘的高樹或農地。常單獨或小群於田野空曠處活動。警覺性高。振翅幅度大，呈波浪狀飛行，三三兩兩在大樹頂端之間來去。築巢於大樹中、上層，以各種樹枝為巢材，巢相當大而醒目。其族群原先因受到獵捕以及缺乏曠野大樹做為營巢處所而不普遍，近年野生動物保育的觀念逐漸深入社會大眾，受到保護，數量逐漸增加。

在本校校園中，喜鵲算是一種相當常見的鳥種，但數量並不多，主要是受到領域性和棲息條件限制所致，加上校園中有鳳頭蒼鷹和領角鴉的族群，限制了牠們數量的增長。喜鵲和樹鵲一樣屬於鴉科的鳥類，都具有相當高的智商，平常在校園中和牠不期而遇，甚至可以擦身而過，但若真正要靠近端詳，牠們會立刻警覺地飛離。❗

關於作者

臺大生態學與演化生物學研究所博士班，自由攝影師，喜愛鳥類生態及風景景觀攝影，現任中華民國自然與生態攝影學會理事。相關著作豐富，出版有《臺灣野鳥地圖》等書。